

Primed 7 Tiromed 250g



PRIMED 7 je prirodan preparat, napravljen po provjerenoj recepturi, na bazi meda i ekstrakta zelenih oraha. Ne sadrži vještačke boje, konzervanse i druge aditive.

Ocjena: Neocjenjeno

Cijena

17,90 €

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

Proizvođa: [Cortex Labs](#)

Opis

PRIMED 7 se preporučuje kod:

- oslabljenje funkcije štitaste žlijezde (Hashimoto tireoiditis ili drugi proces koji dovodi do oštećenja funkcije štitaste žlijezde),
- povećane potrebe za unosom joda iz prirodnih izvora.

Kako djeluje PRIMED 7?

Prirodan sastav preparata obezbjeđuje dobru apsorpciju i iskorištenost aktivnih sastojaka. Svakodnevnom upotrebom PRIMED 7 preparata obezbjeđuje se optimalan dnevni unos joda. Blagotvorno djeluje na simptome koji prate smanjenu funkciju štitaste žlijezde, kao dopuna osnovnoj terapiji. Blagotvorno djeluje na usporavanje toka Hashimoto tireoiditisa i pomaže oporavak funkcije štitaste žlijezde.

Svi proizvodi: Primed 7 Tiromed 250g

Kako se koristi PRIMED 7?

Odrasli i djeca starija od 15 godina: Uzimati 1x dnevno po 1 kafenu kašićicu preparata, pola sata prije ili 2h nakon obroka. Polako otopiti u ustima, a zatim progutati. Najbolje je preparat upotrebljavati ujutru, na prazan želudac. U slučaju uporedne primjene hormonske terapije, dozu PRIMED 7 preparata uzimati kasnije u toku dana.

Za postizanje najboljih rezultata preporučuje se svakodnevna upotreba preparata u trajanju od 3-6 mjeseci. Preparat se može koristiti bez vremenskog ograničenja, sa pauzom od 2-3 nedelje na svakih 6 mjeseci upotrebe.

Mere opreza i kontraindikacije

PRIMED 7 nije lijek niti zamena za lijek i propisanu terapiju. Upotreba suplemenata ne može zamijeniti redovnu i raznovrsnu ishranu. PRIMED 7 ne sadrži hormone, i ne može ih zamijeniti, ukoliko je njihova primjena neophodna! Preparat ne treba da koriste osobe preosetljive na sastojke preparata, osobe sa pojačanom funkcijom štitaste žlijezde i osobe sa insulin-zavisnim dijabetesom.

PRIMED 7 možete koristiti uporedo sa terapijom, odvojeno 2-3h od uzimanja drugih preparata i lijekova. U vezi sa upotrebom preparata u toku trudnoće i perioda dojenja, zatražiti mišljenje nadležnog ljekara.

U toku primjene preporučених dnevnih doza, prema priloženom uputstvu, nisu zabilježene neželjene reakcije i interakcije sa drugim preparatima i lijekovima.

Čuvati na temperaturi do 25 C, zaštićeno od vlage i direktne sunčeve svjetlosti.

Posebno brijemo o tačnosti informacija o proizvodima na našoj web stranici. Međutim, kako se propisi o proizvodnji hrane često mijenjaju može doći do promjena u sastavu hrane, hranljivih materija ili alergena, prehrambenih informacija itd. Uvijek trebale pročitati etiketu na proizvodu, a ne da se oslanjate samo na informacije navedene na web stranici.

Informacije o proizvodima nisu namijenjene dijagnozi i liječenju. Za ozbiljnija zdravstvena stanja i nelagodje obratite se svom ljekaru, terapeutu, homeopatu.

*Slika proizvoda služi samo u ilustrativne svrhe.

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.