

Primed 9 Brusnica 250g



PRIMED 9 Brusnica je prirodan preparat na bazi meda, brusnice i ljekovitog bilja. Ne sadrži vješta?ke boje, konzervanse i druge aditive.

Ocjena:Neocjenjeno

Cijena

16,99 €

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

Proizvo?a?:[Cortex Labs](#)

Opis

PRIMED 9 BRUSNICA se preporu?uje kod:

- urinarnih infekcija, posebno E.coli infekcije
- gastritisa, posebno H. pylori infekcije
- bolesti ženskih genitalnih organa

Sastav: med, brusnica (Vitis ideae fructus), kantaron (Hypericum perforatum), hajdu?ka trava (Achillea millefolium).

Kako deluje PRIMED 9 Brusnica?

Aktivni sastojci preparata uti?u na poboljšanje odbrambenih snaga organizma i pomažu u prevenciji ?estih urinarnih infekcija. Redovnom upotrebom podsti?u bržu eliminaciju bakterija i umanjuju mogu?nost ponovnog javljanja infekcije.

Dodaci ishrani: Primed 9 Brusnica 250g

Kombinacija antibakterijskog i zaštitnog dejstva na sluzokožu želuca, pomaže u prevenciji i tretmanu gastritisa bilo kog uzroka, a posebno gastritisa izazvanog bakterijom *Helicobacter pylori*.

PRIMED 9 Brusnica deluje blagotvorno na zdravlje ženskih genitalnih organa, pa se redovna upotreba preparata preporučuje svim ženama, a posebno kod postojanja hormonskih poremećaja i infekcija.

Kako se koristi PRIMED 9 Brusnica

- Odrasli i djeca starija od 10 godina: Uzimati 1-2x dnevno po 1 kafenu kašičicu preparata, pola sata prije ili 2h nakon obroka. Polako otopiti u ustima, a zatim progutati. Preparat je najbolje upotrebljavati ujutru, na prazan želudac.
- Djeca od 3 do 10 godina: Uzimati 1-3x dnevno po pola kašičice preparata, pola sata prije ili 2h nakon obroka.

Za postizanje najboljih rezultata preporučuje se svakodnevna upotreba u trajanju od 3-6 meseci.

Mere opreza i kontraindikacije

PRIMED 9 Brusnica nije lijek niti zamjena za lijek i propisanu terapiju. Upotreba suplemenata ne može zamijeniti redovnu i raznovrsnu ishranu. Preparat ne treba da koriste osobe preosetljive na sastojke preparata i osobe sa insulin-zavisnim dijabetesom.

PRIMED 9 Brusnica preparat možete koristiti uporedo sa propisanom terapijom, odvojeno 2-3h od uzimanja drugih preparata i lijekova. U vezi sa upotrebom preparata u toku trudnoće i perioda dojenja, zatražiti mišljenje nadležnog lekara. U toku primjene preporučених dnevnih doza, prema priloženom uputstvu, nisu zabilježene neželjene reakcije i interakcije sa drugim preparatima i lijekovima.

Bezbednost

Kontrolu zdravstvene ispravnosti preparata vrše akreditovane laboratorije u Republici Srbiji.

Čuvanje i rok upotrebe

Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i direktne sunčeve svetlosti. Upotrebljivo do datuma odštampanog na ambalaži.

Posebno iznemo o tačnosti informacija o proizvodima na našoj web stranici. Međutim, kako se propisi o proizvodnji hrane često menjaju može doći do promjena u sastavu hrane, hranljivih materija ili alergena, prehrambenih informacija itd. Uvijek trebale pročitati etiketu na proizvodu, a ne da se oslanjate samo na informacije navedene na web stranici.

Informacije o proizvodima nisu namijenjene dijagnozi i liječenju. Za ozbiljnija zdravstvena stanja i nelagodje obratite se svom lekaru, terapeutu, homeopatu.

*Slika proizvoda služi samo u ilustrativne svrhe.

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.